

DESCRIPTION D'UN AMPHIBIEN NOUVEAU, DE MADAGASCAR,  
APPARTENANT AU GENRE PLETHODONTOHYLA

PAR F. ANGEL.

Le Service des Reptiles et Poissons a reçu récemment une petite collection de Reptiles et d'Amphibiens adressée au Muséum par M. COUDREAU, Conservateur des Réserves naturelles de Madagascar. Parmi ces échantillons, se trouve un Amphibien de la Famille des Microhylidés (sous-famille des Cophylidés); il représente une espèce nouvelle que je dédie avec grand plaisir au donateur.

**Plethodontohyla coudreaui**, nov. sp.

Museau court, représentant 1 fois  $1/2$  le diamètre de l'œil, arrondi. *Canthus rostralis* distinct, anguleux. Narine percée sous le *Canthus rostralis*, un peu plus près de l'œil que du bout du museau. Espace interorbitaire deux fois plus large que la paupière supérieure. Tympan peu distinct, son diamètre égal à l'ouverture de l'œil, éloigné de celui-ci par la moitié de son propre diamètre. Doigts et orteils à terminaison obtuse, sans disque à leur extrémité, courts, avec un rudiment de palmure à leur base. Tubercules sous-articulaires des doigts et des orteils peu marqués, mais toutefois allongés, aplatis. Tubercule métatarsien interne, gros, ovalaire, deux fois plus long que l'orteil interne; pas de tubercule métatarsien externe. Premier doigt beaucoup plus court que le second qui est un peu plus long que le quatrième. Une petite frange dermique le long des doigts et orteils. Articulation tarso-métatarsienne atteignant un point entre le tympan et l'œil; le quatrième orteil, entre l'œil et la narine. Face supérieure, sauf celle des cuisses, parsemée de petites verrues, longues ou arrondies, sur un fond lisse, certaines d'entre-elles formant le tracé de deux lignes dorsales divergeant en avant, chacune se dirigeant vers la région postérieure de l'œil. Sur la gorge, la poitrine et le ventre, la peau est grossièrement granuleuse. Une série de tubercules placés à la suite les uns des autres forme un léger bourrelet supra-tympanique. Paupières verruqueuses.

COLORATION. — Brun clair au-dessus, avec des marques symétriques foncées sur la tête et le dos, formées par la trace d'un x, entre les épaules, dont les branches supérieures se dirigent vers la région postoculaire et les inférieures vers les côtés du milieu du corps d'où elles s'incurvent à nouveau vers la région vertébrale pour s'unir sur celle-ci. Le reste du dos, en arrière, est brun foncé à peu près uniforme. Entre les yeux, un chevron foncé à pointe dirigée vers la partie postérieure. La face inférieure est tachetée de brun foncé, intensément. Partie postérieure des cuisses longitudinalement coupée par la teinte foncée du dessous et par celle, plus claire, du dessus, qui tranchent très nettement l'une sur l'autre, de façon rectiligne.

Mensurations :

Du museau à l'anus .....	26 millimètres
Longueur de la tête.....	9 »
Plus grande largeur de la tête.....	12,5 »
Longueur du membre postérieur.....	28 »
Longueur du membre antérieur.....	11 »
Longueur du museau.....	3 »
Diamètre de l'œil.....	2,2 »
Espace interorbitaire.....	3,8 »

Provenance : Réserve de Betampona (forêt orientale, près de Moramanga, à mi-chemin, entre Tamatave et Tananarive). — Récolté par M. COUDREAU, en janvier 1937. N° Coll. Mus. : 1937-19.

Cette espèce s'apparente à *P. tuberala* (Peters). Elle s'en distingue principalement par la grandeur du tympan, la longueur du 2<sup>e</sup> doigt, la position de la narine, la peau fortement granuleuse sur la gorge et le ventre, la présence d'un seul tubercule métatarsien, enfin, par la coloration.